

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель Департамента  
госсанэпиднадзора Минздрава  
России

С.И.Иванов



«01» 08 2002г.  
№ 14-3/299-09

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ**

по применению дезинфицирующего средства  
«Самаровка-антисептик ОП»  
ООО "Самарово"(Россия)

«СОГЛАСОВАНО»

*З.В.* Председатель Подкомиссии по  
дезинфекционным средствам  
Федеральной комиссии по  
МИБП, Д и ПКС Департамента  
госсанэпиднадзора Минздрава России,  
академик РАМН

М.Г. Шандала

2002 г.



Москва 2002 г.



**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ**  
по применению дезинфицирующего средства «Самаровка-антисептик ОП»  
ООО «Самарово» (Россия)

Разработаны Научно-исследовательским институтом дезинфектологии Министерства здравоохранения Российской Федерации

Авторы: Мельникова Г.Н., Пантелеева Л.Г., Родионова Р.П., Сукиасян А.Н.

Предназначены для персонала лечебно-профилактических учреждений и центров Государственного санитарно-эпидемиологического надзора РФ.

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство "Самаровка-антисептик ОП" представляет собой готовый к применению кожный антисептик в виде прозрачной жидкости оранжево-коричневого цвета с запахом этилового спирта. Содержит: 0,1% смеси равных количеств ЧАС - алкилдиметилбензиламмоний хлорида (0,05%) и алкилдиметил(этилбензил)аммоний хлорида (0,05%), 75% спирта этилового в качестве действующих веществ, а также функциональные добавки.

Выпускается в пластиковых бутылках вместимостью 1 дм<sup>3</sup>, в пластиковых канистрах по 5 дм<sup>3</sup> и 10 дм<sup>3</sup>. Срок годности - 5 лет со дня изготовления в невскрытой упаковке производителя.

1.2. Средство "Самаровка-антисептик ОП" обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерий туберкулеза, а также грибов рода Кандида и вирусов.

1.3. Средство "Самаровка-антисептик ОП" по параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу согласно гост 12.1.007-76 относится к 4 классу малоопасных соединений. Местно-раздражающие, кожно-резорбтивные и сенсибилизирующие свойства в рекомендованных режимах применения у средства не выражены.

1.4. Средство "Самаровка-антисептик ОП" предназначено для обработки кожи операционного и инъекционного полей, а также локтевых сгибов доноров.

## 2. ПРИМЕНЕНИЕ

2.1. Обработка кожи операционного поля и локтевых сгибов доноров: кожу протирают двукратно отдельными стерильными марлевыми тампонами, обильно, смоченными средством. Время выдержки после окончания обработки -2 минуты. Накануне операции больной принимает душ (ванну), меняет белье.

2.2. Обработка инъекционного поля: кожу протирают стерильным ватным тампоном, обильно смоченным средством. Время выдержки после окончания обработки -1 минута.

## 3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПЕРВОЙ ПОМОЩИ.

3.1. Средство "Самаровка-антисептик ОП" используют только для наружного применения.

3.2. Не наносить на раны и слизистые оболочки.

3.3. Средство горючее! Не допускать контакта с открытым пламенем и включенными нагревательными установками .

3.4. Хранить отдельно от лекарственных средств, в недоступном для детей месте при температуре от 0°С + 30°С в плотно закрытой таре изготовителя.

3.5. Не использовать по истечении срока годности.

3.6. При случайном попадании средства в глаза их следует обильно промыть проточной водой и закапать 30% раствор сульфацила натрия.

3.7. При случайном попадании средства в желудок - обильно промыть желудок водой комнатной температуры. Затем выпить несколько стаканов воды с добавлением адсорбента (10-15 таблеток измельченного активированного угля на стакан воды).